

ALIMENT FONCTIONNEL, EFFICACE, SÛR, ET FIABLE,
VERIFIÉ SCIENTIFIQUEMENT, DERIVÉ DU SON DE RIZ

IMMUNOMODULATEUR™
FIABLE ET EPROUVÉ

ImunoBran®

COMPOSANT D'ARABINOXYLANE DE SON DE RIZ

Posologie d'ImunoBran®

*Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos produits,
non seulement pour un soutien immunitaire efficace, mais
aussi pour améliorer la qualité de vie.*

Bonjour,

Merci de l'intérêt que vous portez à notre ImunoBran®.

ImunoBran n'est pas seulement un complément alimentaire efficace et de surcroît de qualité, c'est aussi une protection sur le long terme pour notre santé et notre immunité.

Nos produits ImunoBran® :

Produit	Conditionnement		Classe	Photo
ImunoBran® 1000	105	Sachets	Aliments Fonctionnels	
ImunoBran® 1000	30	Sachets	Aliments Fonctionnels	
ImunoBran® 250	50	Comprimés	Aliments Fonctionnels	

ImunoBran® MGN-3 est disponible en sachets de 1000 mg et en comprimés de 250mg.

4 comprimés ImunoBran® 250 = **1 sachet ImunoBran® 1000**
(Usage recommandé) contient 1g d'arabinoxylane de son de riz (Usage recommandé) contient 1g d'arabinoxylane de son de riz

Etant donné que, en présence d'ImunoBran®, l'organisme ne crée pas de résistance en cas d'utilisation prolongée dans le temps, ce complément alimentaire peut être administré en toute sécurité et avec efficacité sur une longue période sans besoin d'augmenter progressivement la dose, contrairement aux autres immunomodulateurs.

Le dosage général est de 30 à 45 mg par kg de poids corporel. Les personnes de forte corpulence peuvent prendre jusqu'à 4 sachets par jour.

Si le patient oublie de prendre ImunoBran®, il ne doit pas s'inquiéter, il peut le prendre à tout moment de la journée, il n'est pas nécessaire de doubler la dose, il continue à le prendre comme d'habitude le jour suivant.

Le contenu de la poudre ImunoBran est versé dans un verre d'eau ou une boisson. Mélangez et avalez. Il est préférable de verser le contenu du sachet directement dans la bouche et de boire ensuite un verre d'eau ou une boisson. Il est recommandé de le prendre environ 20 minutes avant ou une demi-heure après un repas. Pour les comprimés ImunoBran®, nous recommandons de les prendre après un repas.

Lors de l'utilisation de l'ImunoBran® MGN-3, il est nécessaire d'augmenter l'apport en liquide (environ 0,5 litre par 15 kg de poids corporel) afin de favoriser l'évacuation des substances toxiques de l'organisme. L'eau ou le thé (menthe, ortie, bouleau ou camomille) sont les meilleurs.

**ImunoBran est un immunomodulateur,
c'est-à-dire qu'il régule le système immunitaire et l'équilibre.**

- ✓ ImunoBran® peut être associé à tout traitement tel que la chimiothérapie, la radiothérapie, etc. Bien entendu, la seule contre-indication à la prise d'ImunoBran® MGN-3 est le fait que le patient prenne des immunosuppresseurs (préparations qui diminuent l'immunité). En clair, si la maladie nécessite une diminution de l'immunité, la prise de produits qui stimulent le système immunitaire serait contre-productive.
- ✓ Sans contre-indications
- ✓ Produit naturel, pas d'OGM, convient aux végétaliens, non toxique

La PREVENTION pour les personnes qui n'ont pas de problèmes de santé graves, mais qui ont du stress, de la précipitation, un travail difficile	1-3 sachets ou 4-12 comprimés d'ImunoBran®/jour	15-30 jours 2 fois par an (printemps et automne)
---	---	--

Pour les personnes fréquemment malades et celles qui ont subi une intervention chirurgicale	1-3 sachet ou 4-12 comprimés d'ImunoBran®/jour	2 mois (3 fois par an)
---	---	-------------------------------

Fatigue post-accouchement et un rétablissement rapide après l'accouchement normal et par césarienne	1 sachet ou 4 comprimés d'ImunoBran®	3 fois par jour pendant 1 mois, puis réduire la dose à 1 fois par jour pendant 3 à 6 mois
--	---	---

Herpès	1 sachet ou 4 comprimés d'ImunoBran®/jour	Minimum 2 à 6 mois
---------------	--	---------------------------

Maladie de Lyme	1 sachet ou 4 comprimés d'ImunoBran®	3 fois par jour pendant les 2 premières semaines, puis réduire la dose à 1 fois par jour , mais de préférence à long terme, pendant 6 mois ou plus, en fonction de la situation du patient
------------------------	---	--

Maladie auto-immune	1 sachet ou 4 comprimés d'ImunoBran®	3 fois par jour pendant 2 semaines puis réduire la dose à 1 fois par jour pendant 3 à 6 mois
----------------------------	---	--

Allergie	1 sachet ou 4 comprimés d'ImunoBran®/jour	Pendant 12 mois ou plus, en fonction de la situation du patient
-----------------	---	--

Cancer	1 sachet ou 4 comprimés d'ImunoBran®	<p>3 fois par jour en cas de cancer, de traitement de chimiothérapie ou de radiothérapie, l'idéal est de commencer la prise d'ImunoBran dès le diagnostic du cancer ou:</p> <p>1) 2 semaines avant la chimiothérapie/radiation/chirurgie, 2) pendant toute la durée de la chimiothérapie/radiation, 3) et 1 à 2 mois après la chimiothérapie/radiation</p> <p>Ensuite, réduire la dose à 1 fois par jour mais de préférence à long terme, pendant 6 à 12 mois ou plus, en fonction de la situation du patient</p>
Dosage après un cancer	1 sachet ou 4 comprimés d'ImunoBran®	3 fois par semaine (lundi, mercredi, vendredi) à long terme

COVID 19 - pour les cures sévères	1 sachet ou 4 comprimés d'ImunoBran®	3 premiers jours 1 fois toutes les 2 heures pendant la journée, puis pendant 1 mois 3 fois par jour , puis réduire la dose à 1 fois par jour à long terme
COVID 19 - pour une cure légère	1 sachet ou 4 comprimés d'ImunoBran®/jour	1 mois (3 fois par an)

Convalescence (rétablissement après une maladie) :


Rétablissement après une maladie	1 sachet ou 4 comprimés d'ImunoBran®	3 fois par semaine (lundi, mercredi, vendredi) pendant 1 à 2 mois, puis il faudra envisager de recommander ImunoBran® en prévention
---	--------------------------------------	--

Enfants :

ImunoBran® convient aux enfants à partir de 3 mois.

Pour les enfants	45 mg sur le poids de l'enfant	2 mois de traitement intensif, puis à renouveler 1 à 4 fois par an en fonction de la fréquence des maladies de l'enfant
-------------------------	--------------------------------	--

Temps des changements de l'activité des cellules NK après absorption de l'ImunoBran.



Ghoneum M., Drew Univ., „Amélioration de l'activité des cellules NK humaines suite à la prise d'Arabinoxylane modifié de son de riz (MGN-3)“, INT.J. IMMUNOTHERAPY XIV(2) p. 89-99, 1998

Bien sûr, toute personne et sa maladie est individuelle, nos recommandations sont résumées pour le plus grand nombre possible de patients. Pour des cas particuliers, nous restons à votre disposition pour des consultations individuelles avec nos spécialistes.

Nos coordonnées pour que nous organisions une réunion ou une visioconférence :
+352 621 707 719 ou par e-mail : imuno@imunobran.lu.

Toutes les descriptions de produits, les recommandations de consommation et les autres contenus de notre site sont donnés à titre informatif uniquement et sont basés sur les spécifications du fabricant ou tirés de la presse spécialisée. Ils ne prétendent pas être complets ou exacts et ne remplacent en aucun cas les conseils médicaux ou pharmaceutiques d'un médecin ou d'un pharmacien. Ils ne peuvent être utilisés à des fins diagnostiques ou thérapeutiques au sens médical du terme. Aucune responsabilité n'est acceptée pour les dommages de toute nature découlant directement ou indirectement de l'application ou de l'utilisation des informations.

PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES.